




LA TAILLE D'HIVER DES ARBRES A PEPINS


Hiver-printemps 2024

Vers 3 - Ne pas jeter sur la voie publique. 1 2020 Tirage JAN


• Taille d'un RAMEAU : au dessus d'un bourgeon



• Taille d'une branche secondaire : 2 exemples (croquis)



• Taille d'une branche principale



Face au fruitier à tailler il convient de distinguer plusieurs choses:


- **le gourmand** pousse très active et vigoureuse qui pousse en général à la verticale. Il attire toute la sève, c'est pourquoi, on le coupe au ras de la charpentièr.

- **Le rameau à bois** (3), bien moins vigoureux que le gourmand et plus fin est muni d'yeux à bois peu visibles à la base.

- **La brindille** (4) peut être par un œil à bois ou par un œil renflé destiné à fructifier (**brindille couronnée**)

- Le bouton à bois (œil) (6) qui pique le doigt dessus.

- Le bouton à fleurs beaucoup plus arrondi et les petites écailles qui le couvrent sont visibles. Il donnera des fruits à coup à coup sûr.



LES BRANCHES FRUITIERES

3. **Rameau à bois**: assure la croissance et le renouvellement des branches fruitières (en moyenne plus de 20 cm) ne porte que des bourgeons à bois en général.
4. **Brindille**: petit rameau à bois pouvant porter des bourgeons à fleurs (inférieur à 12 cm) et pouvant être conservé comme tire sève. À 5 par arbre jeune.
5. **Dard**: courte brindille (+ ou moins de 1 cm) peut se renouveler plusieurs années de suite. A bois la 1ère année, il devrait « aller à fleurs » par la suite.
6. **Bourgeon à bois** (qui pique): (œil)
7. **Bourgeon à fleur**: généralement, plus gros et plus rond que le précédent. Attention au diamètre de la branche porteuse!
8. **Bourse**: rameau court, renflé, siège d'une fructification passée et souvent d'un nouvel œil à fruit.

Chaque année, il est recommandé de ne jamais éliminer plus du quart des branches vivantes. Il est préférable de tailler un rameau vertical et de laisser intact ou raccourcir un rameau horizontal.

LA TAILLE FRUITIERE

Les outils de taille

Les sécateurs, scies égoïnes et échenilloirs devront avoir des lames propres et sans rouille. sur les parties coupantes. Graissage et désinfection à l'alcool à brûler seront nécessaires pour éviter la propagation des maladies cryptogamiques.

Les erreurs à ne pas commettre

Si la taille des fruitiers est nécessaire, chaque année, on ne peut tailler plus de 25 % du volume des branches à tailler. La taille de formation se planifie en fonction de la vivacité du sujet à tailler, de l'espèce, et de l'état de santé du sujet, mieux vaut programmer sur 2 ou 3 ans la taille de formation pour éviter que l'arbre ne fasse des pousses importantes oubliant au passage la mise à fruits. Un arbre portant trop de fruits et ne donnant plus de bois, ne sera pas toujours bon pour la santé et la longévité de l'arbre.

.../...


LA TAILLE DES FRUITIERS A PEPINS

La taille au fil des ans

1^{re} Première année

Au début de sa formation, la coursonne, simple rameau à bois, ne porte que des yeux à bois.

● Coupez ce rameau au-dessus du 3^e œil bien formé. En le taillant, vous ralentissez la montée de la sève (elle favorise l'allongement de la coursonne) et encouragez la production de fruits pour les années à venir.



2^e Deuxième année

Normalement, le troisième œil a formé un rameau à bois stérile.

● Taillez ce dernier au-dessus du 2^e œil, cela afin de limiter la montée de la sève et de conserver les deux bourgeons intacts. L'œil situé au milieu est devenu un dard et celui que l'on trouve à la base ne s'est pas développé, on dit alors qu'il est latent.




3^e Troisième année

Le dard, au bout d'un an, s'est transformé en bouton à fleurs. Sans incident (gel, maladie...), ce dernier donnera des fruits.

● Taillez maintenant la coursonne juste au-dessus de ce bouton à fleurs.

En effet, sa partie supérieure est inutile puisque seuls des yeux à bois s'y développent. Quant à l'œil dit latent, il s'est transformé en dard.




4^e Quatrième année

Le bouton à fleurs a produit des fruits, il s'est alors transformé en bourse. Quant au dard, le voilà devenu bouton à fleurs.

● Supprimez la bourse afin de ne conserver que l'organe susceptible de fructifier, le plus près possible de la branche charpentière.

Attention, on ne conserve jamais plusieurs boutons à fleurs sur une même coursonne non ramifiée.


L'an prochain, le bouton à fleurs évoluera en bourse pour donner à son tour des fruits.



5^e Cinquième année

La bourse se trouve bien à la place du bouton à fleurs.

Cette dernière va maintenant donner des fruits plusieurs années de suite, sans qu'aucune taille ne soit nécessaire.



La fin d'une coursonne

● Une coursonne munie d'une bourse se conserve cinq années au maximum. Ensuite, il faut la rajeunir et en reformer une nouvelle au même endroit, en recommençant les étapes de la taille au début.

● Coupez la coursonne à la base des rides présentes sur l'écorce. S'y développeront des bourgeons latents qui formeront un rameau à bois.

● Si un rameau à bois existe déjà à proximité de la coursonne que vous souhaitez supprimer, conservez-le. Vous couperez ce rameau au-dessus du 3^e œil (voir année 1) et gagnerez ainsi une année.



Vert la Vie, une association à votre écoute, contact:
Bernard Taillé ☎ 06 66 19 57 82 président
Alain Rousseau ☎ 07 81 32 28 11 animateur rédacteur
Site internet : vertlavie.fr

Siège social: 4 rue du Fief Guérin 85270 St Hilaire de Riez

